

วิธีการใช้ยา Vaginal gel (รูปแบบกระเปาะ)

1



เตรียมยา

จับปลายหลอดยาด้านหลังด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้
เสียบปลายหลอดด้านข้างลงจนยาลงไปอยู่ที่ปลาย
ด้านข้างทั้งหมด

2



ปิดฝาครอบที่ปลายหลอด

ปิดฝาครอบที่ปลายหลอดยาออกแล้วทิ้งไป
อย่าเพิ่งถอดกระเปาะอากาศที่ปลายด้านหน้าในขั้นตอนนี้

3



สอดยา

นั่งเอนไปด้านหลังหรือนอนหงาย ชันเข้าขึ้นและแยกขา
สอดหลอดยาเข้าทางช่องคลอดจนมือที่จับปลายหลอดยา
สัมผัสกับลำตัว
ถอดกระเปาะอากาศที่ปลายด้านหน้าเพื่อปลดปล่อยยา

คำแนะนำเพิ่มเติม:

- นำหลอดยาออกและทิ้งไป หลอดยาแต่ละหลอดใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
- ตัวยาจะคงอยู่ในช่องคลอดได้หลายวัน ในระหว่างนี้อาจพบตกขาวเป็นสีขาวขุ่นหรือสีน้ำตาลได้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติหรือเป็นอันตรายแต่อย่างใด
- เก็บยาเหน็บไว้ในที่เย็นเพื่อป้องกันการละลาย ควรเก็บไว้ในตู้เย็นหากกระปุกไว้บนฉลาก

Reference:

The electronic Medicines Compendium (eMC). *Crinone® Package Leaflet: Information for the User*. Available from: <https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1283.pdf> [Accessed 20 June 2021].