


คำแนะนำในการรับวัคซีนทางเลือก

MODERNA



ในสถานการณ์ที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ โดยหลังเข็ม 3 สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน

เข็ม 1	เข็ม 2	ระยะห่าง หลังเข็ม 2	เข็ม 3	ระยะห่าง หลังเข็ม 3	เข็ม 4
moderna	moderna (ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์)	3 เดือนขึ้นไป	moderna	4 เดือนขึ้นไป	moderna
Sinovac / SINOPHARM	moderna (ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์)	3 เดือนขึ้นไป	moderna	4 เดือนขึ้นไป	moderna
AstraZeneca	moderna (ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์)	3 เดือนขึ้นไป	moderna	4 เดือนขึ้นไป	moderna
Pfizer	moderna (ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์)	3 เดือนขึ้นไป	moderna	4 เดือนขึ้นไป	moderna
Johnson & Johnson		2 เดือน	moderna (เข็มกระตุ้น)	4 เดือนขึ้นไป	moderna
Sinovac / SINOPHARM	Sinovac / SINOPHARM	4 สัปดาห์ขึ้นไป	moderna	4 เดือนขึ้นไป	moderna
Sinovac / SINOPHARM	AstraZeneca	3 เดือนขึ้นไป	moderna	4 เดือนขึ้นไป	moderna
AstraZeneca	AstraZeneca	3 เดือนขึ้นไป	moderna	4 เดือนขึ้นไป	moderna
Sinovac / SINOPHARM	Pfizer	3 เดือนขึ้นไป	moderna	4 เดือนขึ้นไป	moderna
Pfizer	Pfizer	3 เดือนขึ้นไป	moderna	4 เดือนขึ้นไป	moderna
AstraZeneca	Pfizer	3 เดือนขึ้นไป	moderna	4 เดือนขึ้นไป	moderna
Sinovac / SINOPHARM	Sinovac / SINOPHARM	4 สัปดาห์ขึ้นไป	AstraZeneca	4 เดือนขึ้นไป	moderna
Sinovac / SINOPHARM	Sinovac / SINOPHARM	4 สัปดาห์ขึ้นไป	Pfizer	4 เดือนขึ้นไป	moderna
Sinovac / SINOPHARM	AstraZeneca	3 เดือนขึ้นไป	AstraZeneca	4 เดือนขึ้นไป	moderna
AstraZeneca	AstraZeneca	3 เดือนขึ้นไป	Pfizer	4 เดือนขึ้นไป	moderna

หมายเหตุ - ผู้ที่เคยติดเชื้อ ให้รับวัคซีนตามแนวทางเดียวกับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อ โดยควรรับวัคซีน หลังการติดเชื้ออย่างน้อย 3 เดือน สำหรับเด็กอายุ 6-17 ปี ขอให้อยู่ภายใต้คำแนะนำของกุมารแพทย์อย่างใกล้ชิด